

Защищаемся от клещей

Надевайте светлую одежду,
на ней хорошо видно клещей,
желательно гладкую,
за нее им сложнее цепляться


Одежда должна быть
с длинными рукавами и
плотно прилегающими
к запястью манжетами

Всегда заправляйте
одежду в штаны

Клещи подстерегают жертву
сидя на траве, особенно
их много вдоль тропинок.
Остерегайтесь высокой
травы и кустарника,
держитесь середины тропы

Обязательно надевайте
головной убор

Обрабатывайте одежду
акарицидными или
репеллентными
препаратами



Надевайте штаны,
заправляйте их в носки или
высокую и закрытую обувь



Как защититься от клеща?



Способы защиты от клеща:

- Правильно одевайтесь: брюки, заправленные в обувь или носки; верхняя одежда, заправленная в брюки; плотные манжеты; головной убор
- Не сидите на траве
- Сделайте прививку
- Используйте репеллент
- После похода в лес проверьте верхнюю одежду и нижнее бельё, осмотрите тело, расчешите волосы мелкой расчёской;
- Проверьте шерсть домашних животных, а также свежесорванные растения

Что делать, если клещ обнаружен уже присосавшимся к коже:

- осторожно захватить клеща пинцетом, повернуть его тело вокруг своей оси и изъять.
- место укуса продезинфицировать (70% спиртом, йодом, зеленкой)
- снятого клеща следует сжечь или залить кипятком
- руки тщательно вымыть с мылом

Заболевания, которые переносят лесные клещи:

Инкубационный период

Симптомы

Энцефалит
7 - 15 дней

Озноб, температура, тошнота, рвота, головная боль в области глаз и лба, светобоязнь, эпилептические припадки, нарушение сознания, иногда - кома.

Болезнь Лайма/
Боррелиоз
3 - 45 дней

Озноб, температура, тошнота, мигрирующая эритема - сыпь, выраженная воспалённым эпицентром, участком здоровой кожи и еще одним воспалённым розовым кольцом вокруг.

Гранулоцитарный
анаплазмоз человека
3 - 23 дня

Озноб, лихорадка, температура, тошнота, рвота, кашель, увеличение лимфоузлов, снижение аппетита, сильная мучительная головная боль, не редки случаи поражения печени и почек.

Моноцитарный
эрлихоз
1 - 21 день

Озноб, температура, тошнота, рвота, изменение состава крови, боли в животе, кашель с одышкой, расстройства сознания, отеки.

Не все клещи являются носителями опасных инфекций. Однако в любом случае клеща, извлечённого из кожи, следует поместить в стеклянный флакон (банку) с крышкой. Необходимо срочно обратиться в **лечебно-профилактическое учреждение** и передать сосуд со снятым клещом. Категорически запрещается снимать и давить клещей незащищенными руками (обязательно в перчатках).

ПОМНИТЕ!

При обнаружении присосавшихся к телу клещей необходимо обратиться в медицинское учреждение!



Государственный центр по гигиене и эпидемиологии в Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Государственный центр по гигиене и эпидемиологии в Российской Федерации»



Как вытаскивать клеща

фото с сайта tick.ru



Капните на паразита маслом или вазелином, затем накиньте на него веревочную петлю, как можно ближе к коже

Затяните и минут через 5 начинайте аккуратно раскачивать кровососа, потягивая вверх

Не торопитесь! Операция может занять минут 20, но клещ обязательно выйдет.